

ビムパット点滴静注 100mg

ビムパット点滴静注 200mg

【この薬は？】

販 売 名	ビムパット点滴静注 100mg Vimpat for I.V. infusion 100mg	ビムパット点滴静注 200mg Vimpat for I.V. infusion 200mg
一 般 名	ラコサミド Lacosamide	
含 有 量 (1 バイアル中)	100mg	200mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師又は薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗てんかん剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳内の神経の過剰な興奮をしずめて、てんかん発作を抑えます。
- ・次の病気の人に、医療機関で使用されます。

一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対するラコサミド経口製剤の代替療法

てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にビムパット点滴静注に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・肝臓に重度の障害のある人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・腎臓に重度または末期の障害のある人
- ・肝臓に障害のある人
- ・過去に心臓に心伝導障害や重度の障害（心筋梗塞または心不全など）があった人
- ・ナトリウムチャンネル異常（ブルガダ症候群など）のある人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の人

【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

- ・使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決め医療機関で点滴されます。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を連用中に薬の量を急激に減らしたり、中止したりすると、てんかん発作が悪化したり、てんかん重積状態（てんかん発作をくりかえし、なかなか回復しない状態）があらわれたりすることがあります。医師が使用中止を判断した場合には、少なくとも1週間以上かけて徐々に減量されます。
- ・浮動性めまい、霧視（霧がかかったような見え方）、眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下がおこることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。
- ・PR 間隔の延長（心電図上の波形異常）があらわれることがあるので、使用中は第二度以上の房室ブロックなどに関連する症状（頻脈、脈拍数減少、脈拍不整、めまい、気を失う、動悸（どうき）、息切れなど）に注意してください。この薬の使用中にこれらの症状があらわれた場合には、医師の診察を受けてください。また、ご家族などの方は、患者さんの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、医師に連絡してください。
- ・過去に心臓に心伝導障害や重度の障害（心筋梗塞または心不全など）があった人、ナトリウムチャンネル異常（ブルガダ症候群など）のある人、PR 間隔の延長を起こすおそれのある薬と一緒に使用している人では、この薬の使用開始時および使用中に心電図検査を行い、状態や病態の変化を注意深く観察して使用されます。
- ・易刺激性（ちょっとした刺激で気持ちや体の変調を来す）、興奮、攻撃的になるなどの精神症状があらわれ、自殺企図（死んでしまいたいと感じる）に至ることがあります。患者さんやご家族などの方は、攻撃性、自殺企図などの精神症状があらわれる可能性について医師から十分に理解できるまで説明を受け、医師と緊密に連絡を取り合ってください。ご家族などの方は、患者さんの状態の変化について観察し、変化がみられた場合には、すぐに医師に連絡してください。患者さんご自身も気分に変化があったと感じた場合には、ご家族などの方にも伝えるようにしてください。
- ・複視（ものがだぶってみえる）、霧視（霧がかかったような見え方）などの眼障害があらわれることがあるので、異常を感じた場合には医師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談して。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用中であることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
房室ブロック ぼうしつブロック	めまい、気を失う、立ちくらみ、脈が遅くなる、息切れ
徐脈 じよみやく	めまい、立ちくらみ、息切れ、脈が遅くなる、脈がとぶ、気を失う
失神 しっしん	短時間 意識を失い倒れる
中毒性表皮壊死融解症（TEN） ちゅうどくせいひょうひえしゆうかいしょう(テン)	皮膚が広い範囲で赤くなり破れやすい水ぶくれが多発、発熱、粘膜のただれ
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群） ひふねんまくがんしょうこうぐん（スティーブンス・ジョンソンしょうこうぐん）	発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する
薬剤性過敏症症候群 やくざいせいかびんしょうしょうこうぐん	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根など）のはれ
無顆粒球症 むかりゆうきゅうしょう	突然の高熱、寒気、喉の痛み

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	リンパ節（首、わきの下、股の付け根など）のはれ、寒気、体がだるい、突然の高熱、発熱
頭部	めまい、気を失う、短時間 意識を失い倒れる、立ちくらみ
眼	目の充血やただれ
口や喉	喉の痛み、唇や口内のただれ
胸部	息切れ

部位	自覚症状
手・足	脈がとぶ、脈が遅くなる
皮膚	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、全身性の発疹、粘膜のただれ、皮膚が広い範囲で赤くなり破れやすい水ぶくれが多発、皮膚が広い範囲で赤くなる

【この薬の形は？】

販売名	ビムパット点滴静注 100mg	ビムパット点滴静注 200mg
性状	無色澄明な注射液	
形状		

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ビムパット点滴静注 100mg	ビムパット点滴静注 200mg
有効成分	ラコサミド	
添加物	塩化ナトリウム、希塩酸	

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ユーシービージャパン株式会社 (<https://www.ucbjapan.com/>)

販売会社：第一三共株式会社 (<https://www.daiichisankyo.co.jp/>)

製品情報センター

電話：0120-693-132

受付時間：9:00～17:30

(土、日、祝日、当社休日を除く)